

Iberogast®

Pflanzliches
Arzneimittel

Flüssigkeit

Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muß Iberogast® jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie bitte die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie bitte Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Iberogast® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Iberogast® beachten?
3. Wie ist Iberogast® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Iberogast® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Iberogast® und wofür wird es angewendet?

Iberogast® ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Magen-Darm-Erkrankungen.

Iberogast® wird angewendet zur Behandlung von funktionellen und motilitätsbedingten Magen-Darm-Erkrankungen wie Reizmagen- und Reizdarmsyndrom sowie zur unterstützenden Behandlung der

Beschwerden bei Magenschleimhautentzündung (Gastritis).

Diese Erkrankungen äußern sich vorwiegend in Beschwerden wie Magenschmerzen, Völlegefühl, Blähungen, Magen-Darm-Krämpfen, Übelkeit und Sodbrennen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Iberogast® beachten?

Iberogast® darf nicht eingenommen werden:

Bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen die Wirkstoffe von Iberogast®. Bei Kindern unter 3 Jahren darf Iberogast® nicht eingenommen werden, da keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Iberogast® ist erforderlich:

Wenn bei erstmaliger Anwendung von Iberogast® die Beschwerden sich nicht bessern, sollte nach einer Woche ein Arzt aufgesucht werden, um organische Ursachen auszuschließen. Sollten sich die Beschwerden unter Einnahme von Iberogast® verschlimmern oder neue Beschwerden hinzukommen, ist grundsätzlich ein Arzt aufzusuchen.

Bei Kindern unter 6 Jahren sollte bei Bauchschmerzen grundsätzlich ein Arzt aufgesucht werden.

Bei der Einnahme von Iberogast® mit anderen Arzneimitteln:

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bei der Einnahme von Iberogast® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Aus den vorliegenden Daten lassen sich keine Hinweise für Bedenken hinsichtlich der Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit ableiten. Gleichwohl soll Iberogast® während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch bzw. empfohlener Dosierung von Iberogast® ist keine Beeinträchtigung der Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder beim Bedienen von Maschinen zu erwarten.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Iberogast®:

Iberogast® enthält 31 % Alkohol.

3. Wie ist Iberogast® einzunehmen?

Soweit nicht anders verordnet, wird Iberogast® 3mal täglich vor oder zu den Mahlzeiten in etwas Flüssigkeit wie folgt eingenommen:

Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren	20 Tropfen
Kinder von 6 bis 12 Jahren	15 Tropfen
Kinder von 3 bis 5 Jahren	10 Tropfen

Grundsätzlich besteht keine Beschränkung der Anwendungsdauer. Die Dauer der Einnahme richtet sich nach Art, Schwere und Verlauf der Erkrankung.

Vor Gebrauch schütteln!

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Wenn Sie eine größere Menge von Iberogast® eingenommen haben, als Sie sollten?

Bisher ergaben sich keine Hinweise auf eine akute Überdosierung. Grundsätzlich ist aber der Alkoholgehalt zu berücksichtigen.

Wenn Sie versehentlich einmal 1 bis 2 Einzeldosen von Iberogast® mehr als vorgesehen eingenommen haben, d. h. insgesamt 40 bis 60 Tropfen, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Falls Sie deutlich höhere Dosen eingenommen haben, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann gegebenenfalls über notwendige Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie Iberogast® in zu großen Mengen eingenommen haben, sollen Sie beim nächsten Mal mit der Einnahme, wie vom Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fortfahren.

Wenn Sie die Einnahme von Iberogast® vergessen haben?

Wenn Sie die Einnahme von Iberogast® vergessen haben, sollen Sie beim nächsten Mal mit der Einnahme, wie vom Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fortfahren.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Iberogast® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen wie z.B. Hautausschlag, Juckreiz, Atembeschwerden auftreten.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, daß mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Iberogast® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Bitte nicht über +25 °C lagern!

Sollte Iberogast® Ausflockungen oder Trübungen aufweisen, so sind diese ohne Einfluß auf die Wirksamkeit des Präparates.

Iberogast® darf nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

Nach Anbruch des Behältnisses ist Iberogast® 8 Wochen haltbar.

6. Weitere Informationen:

100 ml Flüssigkeit enthalten folgende Wirkstoffe:

Auszüge aus: **Iberis amara**
(**Bittere Schleifenblume** - Frische Ganzpflanze)
(1 : 1,5-2,5) 15,0 ml

Auszugsmittel: Ethanol 50 % (V/V)

Angelikawurzel	(1 : 2,5-3,5)	10,0 ml
Kamillenblüten	(1 : 2 -4)	20,0 ml
Kümmel Früchten	(1 : 2,5-3,5)	10,0 ml
Mariendistel Früchten	(1 : 2,5-3,5)	10,0 ml
Melissenblättern	(1 : 2,5-3,5)	10,0 ml
Pfefferminzblättern	(1 : 2,5-3,5)	5,0 ml
Schöllkraut	(1 : 2,5-3,5)	10,0 ml
Süßholzwurzel	(1 : 2,5-3,5)	10,0 ml

Auszugsmittel für alle Arzneidrogen:

Ethanol 30 % (V/V)

Iberogast® enthält weniger als 0,1 Proteineinheiten pro 20 Tropfen.

Darreichungsform und Inhalt:

Flüssigkeit
Originalpackung mit 20 ml N1
Originalpackung mit 50 ml N2
Originalpackung mit 100 ml N3

Pharmazeutischer Unternehmer: Bayer Vital GmbH
Kaiser-Wilhelm-Allee 70, 51373 Leverkusen
Deutschland

Telefon: (0214) 30 51 348, Telefax: (0214) 3057209
E-Mail-Adresse: bayer-vital@bayerhealthcare.com

Hersteller: Steigenwald Arzneimittelwerk GmbH
Havelstraße 5, 64295 Darmstadt, Deutschland

Stand der Information:
Januar 2016

Apothekenpflichtig
Zul.-Nr. 6463148.00.00



Package Leaflet: Information for the User
Iberogast® oral liquid, herbal medicinal product
Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you. This medicine is also available without a prescription. However, in order to achieve the best results, Iberogast® must be taken as instructed.
 • Please keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Please ask your pharmacist if you need more information or advice.
 • If your symptoms worsen or do not improve, you must contact a doctor.
 • If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

1. What Iberogast® is and what it is used for; 2. Before you take Iberogast®; 3. How to take Iberogast®; 4. Possible side effects; 5. How to store Iberogast®; 6. Further Information.

1. What Iberogast® is and what it is used for

Iberogast® is a herbal medicine for gastrointestinal disorders. Iberogast® is indicated for the treatment of functional and motility-related gastrointestinal disorders such as irritable stomach and irritable bowel syndrome, as well as for the supportive treatment of the symptoms of stomach inflammation (gastritis). These disorders manifest themselves primarily in symptoms such as stomach pain, bloating, flatulence, gastrointestinal spasms, nausea and heartburn.

2. Before you take Iberogast®

Do not take Iberogast®: If you are hypersensitive (allergic) to the active substances of Iberogast®. Children under 3 years may not take Iberogast®, as not enough experience has been acquired of its use in this age group.

Take special care with Iberogast®: If upon the initial use of Iberogast® the symptoms do not improve, a doctor should be consulted after a week in order to rule out organic causes. Should the symptoms worsen while you are taking Iberogast® or new symptoms occur, you should always consult a doctor.

In children under 6 a doctor should always be consulted if there is abdominal pain.

Taking other medicines: There are no known interactions.

Taking Iberogast® with food and drink: There are no known interactions.
Pregnancy and Breast-feeding: The available data provides no indications of reasons for concern with respect to use during pregnancy and when breast-feeding. Nevertheless, Iberogast® should only be taken during pregnancy and when breast-feeding after consultation with a doctor.

Driving and Using Machines: When used as instructed with the recommended dosage, Iberogast® is not expected to impair the ability to drive a motor vehicle or use machines.

Important information about some of the ingredients of Iberogast®: Iberogast® contains 31% alcohol.

3. How to take Iberogast®

Unless otherwise prescribed, Iberogast® is taken 3 times daily before or with meals in a little liquid as follows:

Adults and young people aged 13 years and over 20 drops, children 6-12 years 15 drops, children 3-5 years 10 drops.

There is no restriction on the length of use. The length of use depends on the type, severity and course of the disease.

Shake before use!
 Please check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

If you take more Iberogast® than you should: There have so far been no indications of an acute overdose. As a matter of principle, however, the alcohol content must be considered.

If you have accidentally taken 1 to 2 individual doses of Iberogast® more than you should, i.e. a total of 40 to 60 drops, this does not have any negative consequences as a rule. If you have taken considerably higher doses, please inform your doctor. He or she can then take a decision on any necessary measures.

If you have taken too much Iberogast®, you should continue next time with the dose prescribed by your doctor or described in the dosage instructions.

If you forget to take Iberogast®: If you have forgotten to take Iberogast®, you should continue next time with the dose prescribed by your doctor or described in the dosage instructions.

4. Possible side effects

Like all medicines, Iberogast® can cause side effects, although not everybody gets them.

Very rarely you may experience hypersensitivity reactions such as skin rash, itching, difficulty breathing.

In the event of side effects you should stop taking the product and seek the advice of a doctor. He or she can decide on their severity and any necessary further measures.

Reporting of side effects:
 If you observe any side effects, talk to your physician, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly to the Federal Institute for Drugs and Medical Devices, Department of Pharmacovigilance, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, website: www.bfarm.de.

By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Iberogast®

Store all medicines out of the reach and sight of children!
 Please do not store at temperatures above +25°C!

Should Iberogast® show signs of flocculation or turbidity, these do not influence the effectiveness of the drug.

Iberogast® must not be used after the expiry date shown on the container and the outer packaging.

After the container has been opened Iberogast® can be used for a further 8 weeks.

6. Further Information:

100 ml of liquid contains the following active substances: Extracts of: Iberis amara (Bitter candytuff - fresh whole plant) (1:1.5-2.5) 15.0 ml. Extracting agent: ethanol 50% (V/V).

Angelica root (1:2.5-3.5) 10.0 ml; Chamomile flowers (1:2-4) 20.0 ml; Caraway fruit (1:2.5-3.5) 10.0 ml; Milk thistle fruit (1:2.5-3.5) 10.0 ml; Balm leaves (1:2.5-3.5) 10.0 ml; Peppermint leaves (1:2.5-3.5) 5.0 ml; Celandine (1:2.5-3.5) 10.0 ml; Liquorice root (1:2.5-3.5) 10.0 ml.

Extracting agent for all medicinal drugs: ethanol 30% (V/V)
 Iberogast® contains less than 0.1 bread units per 20 drops.

Pharmaceutical form and content:

Liquid. Original pack containing 20 ml N1, 50 ml N2, 100 ml N3

Marketing Authorization Holder:

Bayer Vital GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 70, 51373 Leverkusen, Germany
 Phone: (0214) 30 51 348, Fax: (0214) 3057209
 E-mail address: bayer-vital@bayerhealthcare.com

Manufacturer:

Steigenwald Arzneimittelwerk GmbH, Havelstraße 5, 64295 Darmstadt, Germany
 Information correct as of: January 2016

Only available from pharmacies
 Marketing authorisation number 6463148.00.00

Kullanım Kılavuzu: Kullanıcı için bilgiler

Iberogast® sıvı, bitkisel ilaç
Sizin için önemli olan bilgilerin yer aldığı bu ilaç prospektüsünü başından sonuna kadar okumanızı rica ve tavsiye ederiz. Bu ilaç reçetesiz olarak da satın alınabilir. Ancak, tedavinin en iyi sonucu vermesi için Iberogast® kullanıldığında talimatlara uyulması gerekmektedir.

• İlaç prospektüsünü lütfen saklayınız. Onu ileride tekrar okumak isteyebilirsiniz.
 • Daha başka bilgi veya tavsiyelere ihtiyaç duyduğunuz takdirde lütfen eczaneye başvurunuz.

• Şikayetleriniz çoğaldığında veya iyileşme olmadığında mutlaka bir doktora başvurmanız gerekmektedir.

• Belirtilen yan etkilerden birinin size ciddi sıkıntı vermesi veya bu kullanım kılavuzunda belirtilmeyen yan etkiler fark etmeniz durumunda bunu lütfen doktorunuza veya eczaneye bildiriniz.

İlaç prospektüsünün içeriği:

1. Iberogast® nedir ve ne amaçla kullanılır? 2. Iberogast® alınmadan önce nelere dikkat edilmelidir? 3. Iberogast® ne şekilde alınmalıdır? 4. Hangi yan etkiler ortaya çıkabilir? 5. Iberogast® ne şekilde muhafaza edilmelidir? 6. Diğer bilgiler

1. Iberogast® nedir ve ne amaçla kullanılır?

Iberogast®, mide-bağırsak hastalıklarında kullanılan bitkisel bir ilaçtır. Iberogast®, iritabil mide ve iritabil bağırsak sendromu gibi fonksiyonel ve motiliteye bağlı gastrointestinal hastalıkların tedavisinde kullanılır. Ayrıca mide mukozası iltihabının (gastrit) semptomatik tedavisini destekleyici bir ilaçtır.

Söz konusu hastalıkların belirtileri daha çok mide ağrısı, dolgunluk hissi, şişkinlik, mide-bağırsak spazmları, bulantı ve mide yanması gibi şikayetler halinde ortaya çıkar.

2. Iberogast® alınmadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Iberogast®'ın kullanılmaması gereken durumlara: Iberogast®'ın içerdiği etkin maddelere aşırı duyarlılık (alerji) söz konusu olduğunda. Henüz yeterli deneyim mevcut olmadığında, 3 yaşından küçük çocuklara Iberogast® verilmemelidir.

Iberogast® kullanırken özellikle dikkatli olunması gereken durumlara: Iberogast® ilk defa kullanıldığında şikayetlerde iyileşme olmadığı zaman, rahatsızlığın organik bir sebepten kaynaklanıyor olup olmadığını tespit ettirmek üzere bir hafta sonra bir doktora başvurulmalıdır. Iberogast® kullanımı sırasında şikayetleriniz çoğaldığında veya yeni şikayetleriniz ortaya çıktığında mutlaka bir doktora başvurunuz.

6 yaşından küçük çocuklara karın ağrısı görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurulması gerekir.

Iberogast® başka ilaçlarla birlikte alındığında: Bugüne kadar herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Iberogast® gıda maddeleri ve içeceklerle birlikte alındığında: Bugüne kadar herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.

Hamilelik ve emzirme dönemi: Mevcut verilere göre, ilacın hamilelik ve emzirme döneminde kullanılması sakıncalı olabileceğine dair herhangi bir bulgu yoktur. Yine de hamile ve emziren kadınlar Iberogast®'ı ancak doktorları görüştüğü sonra kullanmamalıdır.

Araç ve makine kullanma kabiliyeti: Iberogast®'a macina uygun ve tavsiye edilen dozajda kullanıldığında araç veya makine kullanma kabiliyetinin olumsuz etkilenmesi beklenmemektedir.

Iberogast®'ın bazı diğer bileşenleri hakkında önemli bilgiler: Iberogast® %31 alkol içerir.

3. Iberogast® ne şekilde alınmalıdır?

Doktor tarafından başka bir doz önerilmediği takdirde Iberogast® günde 3 kez yemeklerden önce veya yemeklerle birlikte bir miktar sıvı ile aşağıdaki dozlarda alınır:

Erişkinler ve 13 yaşından büyük çocuklar 20 damla, 6 ile 12 yaş arası çocuklar 15 damla, 3 ile 5 yaş arası çocuklar 10 damla.

Kullanım süresi konusunda genelde herhangi bir sınırlama yoktur. Kullanım süresi hastalığın türü, şiddeti ve seyrine bağlıdır.

Kullanılmadan önce çalkalayınız!
 Emin olmadığınız zaman lütfen doktorunuza veya eczaneye danışınız.

Olması gerektiğinden daha fazla miktarda Iberogast® alındığında: Şimdiye kadar akut doz aşımı bildirilmemiştir. Ancak, ilacın içerdiği alkol oranı genel olarak dikkate alınmalıdır.

Yanlışlıkla öngörülen 1 ila 2 tek doz Iberogast® – yani toplam 40 ile 60 damla arası – alındığında olumsuz bir etki genellikle söz konusu değildir. Ancak ilacı bundan çok daha yüksek dozlarla almış olduğunuz takdirde, lütfen doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz geldiğinde alınacak önlemler konusunda karar verecektir.

Fazla miktarda Iberogast® alındığında ilacı bir dahaki sefer doktorun belirlediği ya da dozaj talimatında belirtilen şekilde almaya devam ediniz.

Iberogast® almaya unuttuğunuzda: Iberogast® almaya unuttuğunuzda ilacı bir dahaki sefer doktorun belirlediği ya da dozaj talimatında belirtilen şekilde almaya devam ediniz.

4. Hangi yan etkiler ortaya çıkabilir?

Bütün ilaçlar gibi Iberogast® da yan etkilere neden olabilir, ancak bunlar her kullananda ortaya çıkmayabilir.

Çok nadiren örn. deri döküntüsü, kaşıntı, nefes darlığı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.

Yan etkiler meydana geldiğinde ilacı keserek bir doktora başvurulmalıdır. Doktor, yan etkilerin şiddet derecesini tespit ederek gerekli önlemleri önlemle karar verebilir.

Yan etki bildirimi:
 Kendinizde herhangi bir yan etki fark ettiğinizde lütfen hekiminize, ilacı satın aldığınız eczacı veya yetkili tıbbi personel ile görüşünüz. Bu prospektiye belirtilmiş olan yan etkilerde de aynı yolu başvurunuz rica olunur.

Yan etkilerin bir yönünde Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsünün Farmakovijilans Bölümüne bildirilmesi de mümkündür (Adres: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn, web sites: www.bfarm.de). Kendinizde fark ettiğiniz yan etkileri bildirmeye, bu ilacın güvenliğini konusunda daha kapsamlı bilgilerin toplanmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

5. Iberogast® ne şekilde muhafaza edilmelidir?

İlaç çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız!
 Lütfen en çok +25 °C sıcaklıkta saklayınız!

Iberogast®'ta görülebilecek topraklaşma veya bulantılıklar ilacın etkisine tesir etmez.

Şişe üzerinde ve dış ambalajında belirtilen son kullanım tarihi geçtikten sonra Iberogast® kullanılamaz.

Kapağı ilk kez açıldıktan sonra Iberogast® 8 hafta süreyle kullanılabilir.

6. Diğer bilgiler:

100 ml sıvı aşağıdaki etkin maddeleri içerir: Iberis amara total ekstresi (1:1,5-2,5) 15,0 ml. Ekstraksiyon maddesi: Etanol %50 (hacmen).

Angelicae radix ekstresi (1:2,5-3,5) 10,0 ml; Matricariae flos ekstresi (1:2-4) 20,0 ml; Carvi fructus ekstresi (1:2,5-3,5) 10,0 ml; Cardui mariae fructus ekstresi (1:2,5-3,5) 10,0 ml; Melissa folium ekstresi (1:2,5-3,5) 10,0 ml; Menthae piperitae folium ekstresi (1:2,5-3,5) 5,0 ml; Chelidonium herba ekstresi (1:2,5-3,5) 10,0 ml; Liquiritiae radix ekstresi (1:2,5-3,5) 10,0 ml.

Tüm şifalı bitkilerin ilaksiyonu maddesi: Etanol %30 (hacmen)
 Iberogast® her 20 damla da N1, 50 ml'den daha az ekmeke birimi (BE) içerir.

Sunum biçimi ve içeriği:

Sıvı, 20 ml'lik orijinal ambalaj N1, 50 ml'lik orijinal ambalaj N2, 100 ml'lik orijinal ambalaj N3

Ruhsat sahibi:

Bayer Vital GmbH, Kaiser-Wilhelm-Allee 70, 51373 Leverkusen / Almanya
 Telefon: (0214) 30 51 348 Faks: (0214) 3057209
 E-posta: bayer-vital@bayerhealthcare.com

Üretici firma:

Steigenwald Arzneimittelwerk GmbH, Havelstraße 5, 64295 Darmstadt / Almanya

Son güncelleme tarihi:

Ocak 2016

Sadece eczanelerde satılır.

Ruhsat no. 6463148.00.00

Liebe Patientin, lieber Patient,

das pflanzliche Kombinationspräparat Iberogast® besteht aus Extrakten aus neun Heilpflanzen, deren Inhaltsstoffe ein umfassendes Wirkspektrum (Multi-Target-Prinzip) in verschiedenen Bereichen des Verdauungssystems bieten. Dort kann Iberogast® beruhigend auf Nerven, entspannend auf Muskeln

und regulierend auf die Magen-Darm-Bewegungen wirken. Zusätzlich kann Iberogast® die Bildung von Magensäure hemmen und die Magenschleimhaut schützen.

Um die Inhaltsstoffe von Iberogast® zu extrahieren, wird Alkohol verwendet. Bei einer Dosis von 20 Tropfen enthält Iberogast® sehr wenig Alkohol. Beispielsweise kann ein Glas Apfelsaft soviel Alkohol enthalten wie in 20 Tropfen Iberogast® vorhanden sind.

Magen-Darm-Beschwerden haben viele unterschiedliche Ursachen.

Magenschmerzen, Völlegefühl, Blähungen, Magen-Darm-Krämpfe, Übelkeit und Sodbrennen treten oft ohne organische Grunderkrankung und häufig in Kombination auf. Man spricht deshalb auch von **funktionellen** Magen-Darm-Erkrankungen. Die Ursachen hierfür können vielfältig sein, wie z. B. empfindliche Magennerven, eine gereizte Magenschleimhaut oder eine gestörte Säureproduktion. Jedoch gehen sehr häufig die Beschwerden auf einen gestörten Bewegungsablauf (Motilität) der Magen-Darm- Muskeln zurück, sind also **motilitätsbedingt**.

So kann Iberogast® Ihnen helfen

Wenn beispielsweise der Speicher im oberen Teil des Magens (Fundus) verkrampft ist, kann er sich bei der Nahrungsaufnahme nicht richtig

ausdehnen. Völlegefühl und Krämpfe können die Folge sein. Iberogast® kann die verkrampften Muskeln des Magenspeichers entspannen und für eine ausreichende Dehnung sorgen.

Im unteren Teil des Magens, dem Transporter (Antrum), können erschlaffte Muskeln dazu führen, dass die Nahrung zu lange im Magen liegt. Iberogast® kann die Muskelbewegung im Antrum anregen

und somit für eine geregelte Durchmischung und den Weitertransport der Nahrung sorgen. Blähungen, Druck und Übelkeit können damit gebessert werden.

Wenn der Druck im Magen zu groß ist, weil die Nahrung nicht weitertransportiert wird, und der Schließmuskel (Sphinkter) zwischen Speiseröhre und Magen zu schlaff ist, kann Magensäure in die Speiseröhre gelangen – Sodbrennen kann die Folge sein. Hier kann Iberogast® helfen, indem es den Druck beiseitigt und dadurch auf den Schließmuskel wirkt, so dass die Magensäure nicht in die Speiseröhre gelangen kann.

Das können Sie selbst für Ihren Magen tun

Hören Sie auf Ihren Bauch!
 Jeder weiß selbst am besten, was ihm buchstäblich auf den Magen schlägt. Neben fetten, scharfen oder üppigen Mahlzeiten gehören Stress und Bewegungsmangel zu den häufigsten Auslösern für Magen-

beschwerden. Achten Sie daher auf eine gesunde Ernährung, eine ausgewogene Lebensweise und viel Bewegung an der frischen Luft. Dies ist das Beste was Sie für Magen und Darm tun können.

Bayer wünscht gute Besserung!

Bayer

4100B/1115/10:1